

Electronic Certificate

**Version:** 1 . 0

**Document Number:** DK-AM2-2500025

**Document Name:** DK AM2 E-mail patientrapporterede resultater Apr 25

**Country:** Denmark

**Product:** AM2M

**Type:** Material

**Sub Type:** Mailing

**Classification:**

**Material Intent:** Promotional

**Description:** DK AM2 E-mail patientrapporterede resultater Apr 25

**Target Audience:** HCP Nurses

**Method of Dissemination:** E-Mailing

Certification Statement

We certify that the final electronic form of this material is in accordance with the regulations set forth by the health authority for the country of this document, and is a fair and truthful presentation of the facts about the product.

Role	Signature
Arex Advisor - Compliance Approval (promotion@otsuka-europe.com)	Meaning: As the Compliance, I approve this document for use. Date: 07-Apr-2025 14:02:42 GMT+0000

Subject: Patientrapporterede resultater

{{customRichText:Required}}

Patientrapporterede resultater er vigtige, fordi de giver et patientperspektiv på en sygdom/behandling, som måske ikke ville blive registreret i en klinisk måling, men som kan være lige så vigtigt for patienterne (og deres overholdelse af behandlingen) som en klinisk måling<sup>1</sup>

T. Baune har i 2024 publiceret en artikel, hvor fokus netop er på data fra Real World Evidens og patientrapporterede resultater, når man anvender depotpræparater med længere interval imellem injektionerne. Overordnet skriver han, at nogle af de kendte fordele ved at behandle med depot, er mere udtalte ved behandlinger med længere dosisinterval.

I en større kohorte på 25.361 patienter så man næsten halvt så mange behandlingsophør på de patienter, der var i en behandling med et længere interval imellem injektionerne sammenlignet med patienter, der fik depot hver måned.<sup>2</sup>

På baggrund af ovenstående og andre data i artiklen, konkluderer forfatteren følgende:

*"A long dosing interval for an LAI may have numerous advantages compared to a shorter dosing interval LAI with the same active substance. Therefore, when an effective and tolerable compound has been chosen for treatment of a given patient, it may be advantageous to use it in the LAI formulation with the longest available dosing interval"*<sup>3</sup>


**Hvis du er interesseret i at læse artiklen, så er den publiceret i Current Medical Research and Opinion 2024, vol. 40 no. 1,87-96**



Plasmaniveauer for Abilify Maintena® (aripirazol) hver 2. måned over 2-månedersperioden svarer til plasmaniveauerne for Abilify Maintena hver måned.<sup>4</sup>

Se figur 1 nedenfor; data er efter 4. injektion af Abilify Maintena hver 2. måned og efter 7. og 8. injektion af Abilify Maintena hver måned.<sup>4</sup> Gennem hele perioden er plasmaniveauet over 95 mg/ml, som anses som nedre grænse for det terapeutiske vindue.<sup>5</sup>

## Gennemsnitlige farmakokinetiske koncentrationer efter den 4. dosis Abilify Maintena® 960 mg og den 7. og 8. dosis Abilify Maintena® 400 mg<sup>6</sup>



Abilify Maintena® 960 mg er indiceret til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter stabiliseret med aripiprazol.<sup>4</sup>

\* Over en periode på et år, ophørte 37,1% af patienterne behandlet med paliperidon palmitat hver måned sammenlignet med kun 19,2% af patienterne behandlet med paliperidon palmitat hver 3. måned.<sup>1</sup>

Paliperidon palmitat markedsføres i Danmark som Xeplion®, Trevicta® og synonymer. Se produktresuméer på <https://www.ema.europa.eu>.

{{customRichText:Required}}

{{userName}}

{{userEmailAddress}}

{{UserPhone}}



Otsuka Pharma Scandinavia AB  
Sveavägen 151  
113 46 Stockholm, Sweden  
+46 545 286 60, [www.otsuka.dk](http://www.otsuka.dk)

Læs pligtteksten her om Abilify Maintena® (aripiprazol)

#### Referencer

1. Staniszewska, S., Haywood, K.L., Brett, J., Tutton, L. (2012). 'Patient and public involvement in patient-reported outcome measures: Evolution not revolution'. The Patient, 5(2), 79-87.
2. Cai R, Decuypere F, Chevalier P, et al. Assessment of risk factors of treatment discontinuation among patients on paliperidone palmitate and risperidone microspheres in France, Germany and Belgium. BMC Psychiatry. 2022;22(1):382.
3. Baune, T, Aripiprazole 2-month ready-to-use 960 mg (Ari 2MRTU): review of its possible role in schizophrenia therapy
4. Abilify Maintena® produktresumé
5. Wang X et al. Clin Pharmacol Drug Dev. 2022; 11:150–164
6. Harlin M et al. CNS Drugs 2023; april;37(4): 337-350

---

Your personal data will be processed in accordance with the Otsuka HCP Privacy Notice, which is available [here](#). If you would like to withdraw your consent, you can unsubscribe to receiving emails related to this Therapy Area at any time and without reason by clicking on the unsubscribe link below or by emailing [privacy@otsuka-europe.com](mailto:privacy@otsuka-europe.com).

#### Unsubscribe

Please send adverse events and/or product quality complaints to: [opsab.vigilance@otsuka.se](mailto:opsab.vigilance@otsuka.se) and medical information enquiries in English to: [medical.information@otsuka-europe.com](mailto:medical.information@otsuka-europe.com)

DK-AM2-2500025 v 1.0. Date of preparation: 2025-04-01